

# ПРОГРАМА ПІДЖИВЛЕНЬ

## ПОМІДОР, ПЕРЕЦЬ ОГІРОК, БАКЛАЖАН



### ЛИСТОВЕ ВНЕСЕННЯ

СТАДІЯ РОЗВИТКУ	ПІСЛЯ ПЕРЕСАДКИ	ВЕГЕТАТИВНИЙ РОЗВИТОК	ЗАВ'ЯЗУВАННЯ 1-ї КИТИЦІ
МЕТА ВНЕСЕННЯ			
ЗНЯТТЯ СТРЕСУ ПІСЛЯ ПЕРЕСАДКИ	<b>Tecamin Max</b> 1 л/га/обр. (1 обр.)		
ПРИСКОРЕННЯ РОЗВИТКУ ЛИСТЯ ТА ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ		<b>Tecamin Max</b> 1,5 л/га/обр. (1 обр.)	
РОЗМІР ПЛОДІВ ТА ПОЛІПШЕННЯ ЇХ ЯКОСТІ			<b>Tecamin Max</b> 1,5 л/га/обр. (1 обр.)

### КОРЕНЕВЕ ВНЕСЕННЯ

СТАДІЯ РОЗВИТКУ	ПІСЛЯ ПЕРЕСАДКИ	ВЕГЕТАТИВНИЙ РОЗВИТОК	ПЕРЕД ЦВІТІННЯМ	ЗАВ'ЯЗУВАННЯ 1-ї КИТИЦІ	ПОСЛІДОВНИЙ РОЗВИТОК ПЛОДІВ ТА ЗАВ'ЯЗІВ У КИТИЦЯХ	ДОЗРІВАННЯ УСІХ КИТИЦЬ З ПЛОДАМИ
МЕТА ВНЕСЕННЯ						
ЗНЯТТЯ СТРЕСУ ПІСЛЯ ПЕРЕСАДКИ	<b>Tecamin Ratz</b> 10 мл/л, полив рослин або занурення коренів рослин перед висадкою + <b>Tecamin Ratz</b> 3 л/га/обр. (1 обр.) через 10-15 днів після висадки					
ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЮ		<b>Agriful</b> 3-5 л/га/щотижня. Всього 30-60 л/га за вегетаційний період				
ПОЛІПШЕННЯ ЦВІТІННЯ ТА ЗАВ'ЯЗУВАННЯ ПЛОДІВ		<b>Agriful</b>	<b>Agriful</b>			
ОПТИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПЛОДІВ				<b>Agriful</b>	<b>Agriful</b>	
ОПТИМАЛЬНЕ ДОЗРІВАННЯ ПЛОДІВ						<b>Agriful</b>

Більш часті внесення з пониженими дозами краще, ніж поодинокі внесення з високими дозами.

Наведена інформація носить рекомендований характер.

Дозування повинно бути зменшене, якщо препарати вносяться одночасно в одну фазу розвитку рослин

За більш детальною інформацією звертайтеся до дистриб'ютора та технічного консультанта.

обр. = обробка

